

University of Groningen

Cryochirurgische behandeling van enkele beentumoren

Oeseburg, Harry Berd

IMPORTANT NOTE: You are advised to consult the publisher's version (publisher's PDF) if you wish to cite from it. Please check the document version below.

Document Version

Publisher's PDF, also known as Version of record

Publication date:

1977

[Link to publication in University of Groningen/UMCG research database](#)

Citation for published version (APA):

Oeseburg, H. B. (1977). *Cryochirurgische behandeling van enkele beentumoren: Een experimenteel en klinisch onderzoek*. [, Rijksuniversiteit Groningen]. [S.n.].

Copyright

Other than for strictly personal use, it is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s) and/or copyright holder(s), unless the work is under an open content license (like Creative Commons).

The publication may also be distributed here under the terms of Article 25fa of the Dutch Copyright Act, indicated by the "Taverne" license. More information can be found on the University of Groningen website: <https://www.rug.nl/library/open-access/self-archiving-pure/taverne-amendment>.

Take-down policy

If you believe that this document breaches copyright please contact us providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim.

Downloaded from the University of Groningen/UMCG research database (Pure): <http://www.rug.nl/research/portal>. For technical reasons the number of authors shown on this cover page is limited to 10 maximum.

STELLINGEN

1

De cryochirurgische behandeling van beentumoren verkeert nog in een klinisch-experimenteel stadium.

2

Het mogelijke voordeel van een bestraling van 2x 400 rad vóór het uitvoeren van een biopsie van een beentumor weegt niet op tegen de nadelen; deze radiotherapie kan derhalve beter achterwege gelaten worden.

3

Bij de behandeling van beentumoren is vriescoupe-onderzoek onmisbaar.

4

Na de chirurgische behandeling van een patiënt met een osteosarcoom verdient electieve cytostatische behandeling de voorkeur boven electieve longbestraling.

5

De veelgebruikte indeling van coloncarcinomen volgens Dukes wordt door velen niet juist toegepast.

6

Met behulp van de lijnen van Sappey, opgesteld in 1843, kan de lokalisatie van eventuele lymfogene metastasen van een maligne melanoblastoom van de huid van de romp betrouwbaar worden voorspeld.

Sugarbaker, E. V. en Mc Bride, C. M. (1976). Surgery 80: 22.

7

Percutane blokkade van het ganglion coeliacum bij patiënten met incurabele retro-peritoneale tumorgroei is een methode van pijnbestrijding met uitstekende resultaten; deze eenvoudige techniek verdient meer bekendheid te krijgen.

8

Voor een medicus geldt slechts het eerste gedeelte van het gezegde 'doe wel en zie niet om'; een voortdurende terugblik op de bereikte resultaten is onmisbaar voor het medisch handelen.

9

Bij de behandeling van slijmvliesafwijkingen in de mondholte is lasercoagulatie te verkiezen boven cryochirurgie.

10

De 'Herculean washout' is een vorm van colonvoorbereiding die de chirurg aanspreekt en de patiënt wel doet.

Crapp, A. R. et al. (1975). Lancet II: 1239.

11

Endoscopie is onmisbaar bij de diagnostiek van hoge tractus digestivus bloedingen; bij de opleiding tot internist en chirurg behoort ervaring met deze techniek te worden opgedaan.

12

Door de histamine-H2 receptorantagonisten zijn de therapeutische mogelijkheden van de conservatieve behandeling van het ulcus pepticum vergroot; de indicaties voor chirurgische behandeling van de ulcusziekte zijn echter onveranderd gebleven.

13

Een speler tijdelijk uit een wedstrijd sturen is een rechtvaardiger strafmaatregel dan het tonen van een gele kaart.

14

Alleen dat land, dat zijn onderdanen de vrijheid geeft te vertrekken, kan als een moederland worden beschouwd.

Stellingen behorende bij het proefschrift van H. B. Oeseburg.